

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

侗 鳴

（ 生 薬 製 剤 ）

- ◆「侗鳴」は耳鳴りを改善するために、16種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - （4）胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - （5）次の医薬品を服用している人。 便秘薬（下剤）
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

*まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- *5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

耳鳴り

用法・用量

本品 1 包を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水 500mL（約 3 合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人 1 日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人	1 日分の 1/3 量	3 回
7 歳以上 15 歳以下	成人の 1/2 量	
4 歳以上 7 歳未満	成人の 1/3 量	
4 歳未満	服用しないこと	

食間とは…
食後 2～3 時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （１）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （２）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品 1 包（8g）中、下記生薬を含有します。

オウバク	----- 0.5g	ダイオウ	----- 0.5g	カンソウ	----- 0.5g
トウキ	----- 0.5g	センキュウ	----- 0.5g	シオウ	----- 0.5g
オウゴン	----- 0.5g	サンシシ	----- 0.5g	コウブシ	----- 0.5g
サイコ	----- 0.5g	キシツ	----- 0.5g	チモ	----- 0.5g
モッコウ	----- 0.5g	ポウフウ	----- 0.5g	セイヒ	----- 0.5g
レンギョウ	----- 0.5g				

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （１）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （２）小児の手の届かない所に保管してください。
- （３）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （４）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7