

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

瑞 祥 湯

（生薬製剤）

- ◆「瑞祥湯」は四肢の腫物、頸 胸、肋 腰の痛み 関節炎を改善するために、15種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- （4）胃腸が弱く下痢しやすい人。
- （5）発汗傾向の著しい人。
- （6）高齢者。
- （7）次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
- （8）次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- （9）次の医薬品を服用している人。 便秘薬（下剤）

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------------------|
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
| その他 | 発汗過多、全身脱力感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

四肢の腫物、頸 胸、肋 腰の痛み 関節炎

用法・用量

本品 1 包を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水550mL（約3合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1日服用回数 |
|------------|----------|--------|
| 成 人 | 1日分の1/3量 | 3 回 |
| 7歳以上 15歳以下 | 成人の1/2量 | |
| 4歳以上 7歳未満 | 成人の1/3量 | |
| 4歳未満 | 服用しないこと | |

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品 1 包（30.01g）中、下記生薬を含有します。

| | | | | | |
|-------|------------|--------|-------------|------|------------|
| カンソウ | ----- 1.5g | センブリ | ----- 0.01g | ダイオウ | ----- 0.5g |
| キキョウ | ----- 2.5g | マオウ | ----- 2.5g | トウキ | ----- 2.5g |
| センキュウ | ----- 2.5g | コウブシ | ----- 2.5g | モクツウ | ----- 2.5g |
| タイソウ | ----- 2.5g | トウシンソウ | ----- 0.5g | ハッカイ | ----- 2.5g |
| チンピ | ----- 2.5g | セイヒ | ----- 2.5g | ポウフウ | ----- 2.5g |

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7